

Comportamiento del cáncer laríngeo en Cuba en el período de 2000–2009. Revisión de un tema

Dr. José Ignacio Rey Mugica¹, Dr. Magdiel Rodríguez Labrada²

1. Especialista de I Grado en Medicina General Integral y en Otorrinolaringología.
joseirm@hamc.vcl.sld.cu.
2. Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Residente de Otorrinolaringología. Profesor Instructor de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”.

RESUMEN

La carcinogénesis del carcinoma de laringe es compleja y hoy día se llevan a cabo múltiples estudios etiológicos para determinar el papel de los genes y virus en el desarrollo del cáncer; sin embargo, aun cuando se han encontrado receptores androgénicos en el tejido tumoral laríngeo y se han descrito casos de cáncer de laringe en la mujer, que debutan durante el primer embarazo y con recidivas en cada una de las siguientes gestaciones, así como algunos factores medioambientales, ocupacionales y dietéticos que juegan un papel en la carcinogénesis del carcinoma laríngeo, el alto consumo de tabaco y alcohol generalmente se consideran los principales factores de riesgo del cáncer de laringe. Se realiza una revisión basada en documentos editados por el Centro Nacional de Control del Cáncer con el objetivo de evaluar el comportamiento de esta enfermedad, específicamente del cáncer laríngeo, así como los factores involucrados en su aparición y pronóstico.

DeCS:

NEOPLASIAS LARINGEAS/etiología
FACTORES DE RIESGO

Behavior of laryngeal cancer in Cuba during the period 2000-2009. Review of a topic

SUMMARY

Carcinogenesis of laryngeal carcinoma is complex and many etiological studies are being carried out to determine the role of genes and viruses in cancer development. However, even when androgen receptors have been found in laryngeal tumor tissue and cases of laryngeal cancer in women, with debut during the first pregnancy and relapse in each of the following pregnancies have been described, as well as some environmental, occupational and dietary factors that play a role in the carcinogenesis of laryngeal carcinoma, the high consumption of tobacco and alcohol are generally considered the main risk factors for laryngeal cancer. A review based on documents published by the National Cancer Control is conducted in order to evaluate the performance of this condition, specifically laryngeal cancer, as well as the factors involved in its onset and prognosis.

MeSH:

LARYNGEAL NEOPLASMS/etiology
RISK FACTORS