

Carcinoma epidermoide de pene. A propósito de un caso

MSc. Dr. Freddy Castillo Guerra¹, Dr. Jorge Candido Monzón Rey², Dr. Raúl Santiago López Montes³

1. Especialista de I Grado en Urología. Máster en Longevidad Satisfactoria. Profesor Instructor de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”. freddytcg@hamc.vcl.sld.cu.
2. Especialista de I Grado en Urología. Profesor Instructor de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”.
3. Especialista de I Grado en Urología. Profesor Asistente de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”.

RESUMEN

Presentamos el caso de un paciente operado hace años de un carcinoma epidermoide de pene que, de forma tardía y aparentemente, presentó una recidiva que generó dudas en cuanto a su origen, pues podía ser también un nuevo tumor primario o una recidiva; finalmente se diagnosticó un nuevo tumor del mismo tipo histológico, pero en otro sitio distante de la primera localización. Reseñamos la importancia de un seguimiento de este tipo de tumores tras la operación conservadora dada la posibilidad de recidiva a largo plazo.

DeCS:

CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS/diagnóstico
PENE/cirugía

Squamous cell carcinoma of the penis. Apropos of a case

SUMMARY

It is presented a report on a patient who was operated years ago from a squamous cell carcinoma of the penis and who apparently had a delayed relapse. It raised doubts as to its origin, because it could be a new primary tumor or a relapse. A new tumor of the same histological type was finally diagnosed, but on another location far from the first location. The importance of monitoring this type of tumor after conservative surgery is summarized because of the potential long-term relapse.

MeSH:

CARCINOMA, SQUAMOUS CELL/diagnosis
PENIS/surgery